

КОРЬ: СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ

СТАНДАРТНАЯ

ПРИ ВСПЫШКЕ ИЛИ ПОЕЗДКЕ
В ЗОНУ КОРИ



ПОСЛЕ КОНТАКТА С КОРЬЮ



Корь передается в **6 РАЗ** легче, чем грипп.

У КАЖДОГО ПЯТОГО

заболевшего корью разовьются **осложнения**, такие как ушные инфекции, пневмония, необратимая потеря слуха или энцефалит, вплоть до летального исхода.



Наибольший риск **опасных осложнений** угрожает детям до 5 лет и взрослым старше 20 лет.

Как протекает заболевание корь?

- ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД - с момента заражения до начала высыпания - продолжается 14 дней.



Симптомы кори.

На второй неделе скрытого периода появляются

- лихорадка (высокая температура до 40°C),
- сильная головная боль,
- слабость,
- отсутствие аппетита,
- насморк, кашель,
- конъюнктивит - воспаление слизистой оболочки глаз: глаза краснеют, появляется слезотечение, светобоязнь, впоследствии появляется гнойное отделяемое.



Против кори существуют **безопасные и эффективные** вакцины. Они проходят тщательные испытания, и за **50 лет использования** зарекомендовали себя как очень безопасные.



Две дозы вакцины против кори способны обеспечить **защиту** от болезни практически на **100%**.